

臟腑，經絡が前後して罹病した場合の脈象・證候第一

瘧病，濕病および喝の脈象・證候第二

瘡，難治。一作癰，餘同。

剛柔，爲。瘡時，頭寒。熱濕相得，赤目，赤益，獨虛，動即搖惡，卒甚口，

名曰瘡。急則，者，必汗惡其，發寒惡者，瘡汗急若惡不細致發強；反而因復可項也，沈，不頸病汗出脈多瘡，瘡無汗，太則痛寒，熱熱熱汗之疼足者發發發發下身熱張，雖身反，病病病病，背陽陽陽陽風家者，太太太太夫瘡病噤

八九十一二三四
十二三二二二

[illegible]

手足逆冷，發熱者，少甚，有勞數，身即熱，口前開板齒燥。若發其汗，則其惡寒甚；加
〔四三〕 手溫太無「白虎」以三下八字，並以此條揭中喝之首，沈本、『金鑒』亦列爲首條，『玉函』、『脈經』無
〔四四〕 白知兩虎加（五太物瓜一瓜）石膏（一斤，碎）甘草（二兩）粳米（六合）人參（三
〔四五〕 論曰：能無和四日，百病欲口脈愈出，汗者行苦微，百脈行便每快二宗飲，時，白，悉，致，其，病，也，意，欲，食，常，默，默，欲，
〔四六〕 六百百去再七滑百綿去五八八百去九百百去〇百百一括括二百百三百三四五五六七八九十百千
〔四七〕 〔四八〕 〔四九〕 〔五〇〕 〔五一〕 〔五二〕 〔五三〕 〔五四〕 〔五五〕 〔五六〕 〔五七〕 〔五八〕 〔五九〕 〔六〇〕 〔六一〕 〔六二〕 〔六三〕 〔六四〕 〔六五〕 〔六六〕 〔六七〕 〔六八〕 〔六九〕 〔七〇〕 〔七一〕 〔七二〕 〔七三〕 〔七四〕 〔七五〕 〔七六〕 〔七七〕 〔七八〕 〔七九〕 〔八〇〕 〔八一〕 〔八二〕 〔八三〕 〔八四〕 〔八五〕 〔八六〕 〔八七〕 〔八八〕 〔八九〕 〔九〇〕 〔九一〕 〔九二〕 〔九三〕 〔九四〕 〔九五〕 〔九六〕 〔九七〕 〔九八〕 〔九九〕 〔一〇〇〕

百合病，狐惑病，陰毒および陽毒の脈象・證候とその治療法第三

〔四五〕 論曰：能無和四日，百病欲口脈愈出，汗者行苦微，百脈行便每快二宗飲，時，白，悉，致，其，病，也，意，欲，食，常，默，默，欲，
〔四六〕 六百百去再七滑百綿去五八八百去九百百去〇百百一括括二百百三百三四五五六七八九十百千
〔四七〕 〔四八〕 〔四九〕 〔五〇〕 〔五一〕 〔五二〕 〔五三〕 〔五四〕 〔五五〕 〔五六〕 〔五七〕 〔五八〕 〔五九〕 〔六〇〕 〔六一〕 〔六二〕 〔六三〕 〔六四〕 〔六五〕 〔六六〕 〔六七〕 〔六八〕 〔六九〕 〔七〇〕 〔七一〕 〔七二〕 〔七三〕 〔七四〕 〔七五〕 〔七六〕 〔七七〕 〔七八〕 〔七九〕 〔八〇〕 〔八一〕 〔八二〕 〔八三〕 〔八四〕 〔八五〕 〔八六〕 〔八七〕 〔八八〕 〔八九〕 〔九〇〕 〔九一〕 〔九二〕 〔九三〕 〔九四〕 〔九五〕 〔九六〕 〔九七〕 〔九八〕 〔九九〕 〔一〇〇〕

乾」)。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

腹滿，寒疝，宿食病の脈象・證候および治療法第十

[illegible]

痰飲，咳嗽病の脈象・證候とその治療法第一二

- 11 -

[illegible]

[illegible][illegible]

〔二二一〕	師曰：「有風骨折其水滿爲痲則汗中起風骨，石胸則爲風黃，臥有證風；汗久惡爲者新病外惡喘熱，，此滑蠶	〔二二二〕	脈癢汗口寸微風太汗此眠汗	〔二二三〕	浮爲出多口擁水陽出爲，即	〔二二四〕	浮不自發癢，其上，渴，得發自，證身爲腫，裏者，不者不，脈指外，體洪寒，目起，人寒躁腫其沒，遲，身體有之，不其惡暮如風按沈脈，疹，上視陷酸而痛其。汗腫其，，爲相利，水上，而渴聚，汗黃腑，汗膿則氣通，風足，反之，脾可有證水黃癰強風使，曰手，體得食爲不，外正；致風。小，名其，身汗能此皆水，，喘必，仰，按，發不，，石浮汗不，搏挽者，熱，疼，，者者有亦其滿愈相以風，有咳，不虛室渴數脈發腹不氣難惡，時，反極中不便水其當證久風，不，大時，爲胸，小正水，外，水；腫，痛此，喘，有皮渴，腫氣爲水，目動，疼，痺而利水風，，不沈面爲則風，面脈，節者周咳下水風，自頭則強爲，頸骨寒如。而皮惡鼓脈肢洪氣此，氣其，當惡狀節渴有痛如其四，，水，法。骨，疼腹，風癰虛。有狀，水冷在者，水折其水滿爲痲則汗中起風骨，石胸則爲風黃，臥有證風；汗久惡爲者新病外惡喘熱，，此滑蠶脈，黃然，愈水爲。
-------	--	-------	--------------	-------	--------------	-------	---

[illegible]

[illegible]

黃	必	色	脾	煩	苦	肢	四	；	風	中	非	痺	痺	為	則	緩	風	為	則	浮	，	緩	而	浮	行	脈	口	寸	〔	二	五	三	〕
為	浮	脈	尺	。胃	。食	則	食	，	寒	為	則	緊	穀	消	則	熱	熱	為	則	數	，	數	而	浮	行	脈	口	寸	〔	二	五	三	〕
額	濁	苦	中	曰	氣	不	氣	，	身	眩	則	穀	熱	搏	相	寒	陰	為	則	為	，	緊	數	行	脈	口	寸	〔	二	五	三	〕	
疸	女	疸	穀	疸	吐	黃	盡	，	時	急	則	勝	發	即	寒	被	熱	脾	傷	不	，	便	脈	脈	熱	寸	〔	二	五	三	〕		
雖	勞	。疸	作	明	論	傷	難	，	便	小	食	能	故	遲	而	懷	中	以	難	所	，	故	如	腹	明	之	〔	二	五	三	〕		
，	；	。疸	篇	陽	陽	傷	陽	，	其	欲	，	。疸	故	候	則	飽	飽	以	所	，	，	如	滿	之	之	〔	二	五	三	〕			
吐	之	。吐	先	者	也	浮	者	，	其	足	，	。疸	中	心	其	了	了	不	便	，	必	，	如	之	之	〔	二	五	三	〕			
，	。吐	。吐	先	者	也	浮	者	，	其	足	，	。疸	中	心	其	了	了	不	便	，	必	，	如	之	之	〔	二	五	三	〕			
，	。吐	。吐	先	者	也	浮	者	，	其	足	，	。疸	中	心	其	了	了	不	便	，	必	，	如	之	之	〔	二	五	三	〕			
，	。吐	。吐	先	者	也	浮	者	，	其	足	，	。疸	中	心	其	了	了	不	便	，	必	，	如	之	之	〔	二	五	三	〕			
，	。吐	。吐	先	者	也	浮	者	，	其	足	，	。疸	中	心	其	了	了	不	便	，	必	，	如	之	之	〔	二	五	三	〕			
，	。吐	。吐	先	者	也	浮	者	，	其	足	，	。疸	中	心	其	了	了	不	便	，	必	，	如	之	之	〔	二	五	三	〕			
，	。吐	。吐	先	者	也	浮	者	，	其	足	，	。疸	中	心	其	了	了	不	便	，	必	，	如	之	之	〔	二	五	三	〕			
，	。吐	。吐	先	者	也	浮	者	，	其	足	，	。疸	中	心	其	了	了	不	便	，	必	，	如	之	之	〔	二	五	三	〕			
，	。吐	。吐	先	者	也	浮	者	，	其	足	，	。疸	中	心	其	了	了	不	便	，	必	，	如	之	之	〔	二	五	三	〕			
，	。吐	。吐	先	者	也	浮	者	，	其	足	，	。疸	中	心	其	了	了	不	便	，	必	，	如	之	之	〔	二	五	三	〕			
，	。吐	。吐	先	者	也	浮	者	，	其	足	，	。疸	中	心	其	了	了	不	便	，	必	，	如	之	之	〔	二	五	三	〕			
，	。吐	。吐	先	者	也	浮	者	，	其	足	，	。疸	中	心	其	了	了	不	便	，	必	，	如	之	之	〔	二	五	三	〕			
，	。吐	。吐	先	者	也	浮	者	，	其	足	，	。疸	中	心	其	了	了	不	便	，	必	，	如	之	之	〔	二	五	三	〕			
，	。吐	。吐	先	者	也	浮	者	，	其	足	，	。疸	中	心	其	了	了	不	便	，	必	，	如	之	之	〔	二	五	三	〕			
，	。吐	。吐	先	者	也	浮	者	，	其	足	，	。疸	中	心	其																		

桂枝加黃耆湯方 方見水氣病中
〔二六九〕諸黃，猪鬃煎主之。

〔二七〇〕黃疸病，茵陳五苓散主之。一本云：「茵陳湯及五苓散并主之」。

茵陳蒿末（十分） 五苓散（五分） 方見痰飲中

大黃硝石湯方

中病。治黃疸。見湯兩，以美清酒五升，煮取二升半，頓服盡。冬月用酒，春月用酒三味。黃醇（一之。諸黃黃右煮治麻水。湯金。蒂千。瓜。附。

驚，悸，吐，衄，下血，胸滿，瘀血等の疾病の脈象・證候とその治療第十六

止。今止。知血下。衄血。煩咳。了不得。慧不絕。睛之。目胸按。明能手。去陽不。黃者、弱。量衄視浮。悸止至。衄爲未秋急者。則衄從緊弦弱，脈沈。黃陽陷脈。驚暈太上，爲晴者額熱。即目衄必寒動，夏出無。浮至汗，弱脈春，色而尺從汗血動，「可無脈」：不面口曰家人寸師又衄病。五六七八九。七七八七七。三三三三三。

〔二八〇〕夫吐血，咳逆上氣，其脈數而有熱，不得卧者，死。「數」下，『巢源』

{ 二八 } 有夫寸此酒客咳者子。必致吐血，減漏，此因大急飲過度所致也。
 { 二八 } 寸口名脈曰弦革而，婦人，弦則半產，漏下，男為子，女為胎，寒則為虛，寒虛相擊，

[illegible]

〔二八六〕火邪者，桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯主之。

[illegible]

〔二八七〕心下悸者，半夏麻黃丸主之。『脈經』無此條。

〔二八〕 夏麻二兩，黃麻二兩，麻味吐，丸黃，血不，等之止，分，煉蜜和丸，小豆大，飲服三丸，日三服。

〔二八〕 艾馬此（通遠三升）把一也升，合十煮湯，主取一升，分溫再服。

黃甘 九九瀉大
 王草 ○一心黃右
 湯 〕湯〔三
 方乾石下心方二味
 赤地七血氣亦兩，
 主黃味，不霍亂水
 吐血，先足亂水
 血白以血，黃三
 蚶朮水後吐，連升
 血八便血，（一煮
 附升，此蚶兩取
 子，（煮近血）一
 （炮取血，黃升，
 ）三也瀉，黃升，
 升，心湯（一之）
 阿赤湯（一之）
 膠分小主（一之）
 溫豆之（兩）
 黃二當。
 芩服歸散。主之。方見狐惑中。
 （各三兩）
 兩之。

嘔吐，嘔，下利病の脈象・證候とその治療法第十七条

〔二二九〕 本家嘔；家飲屬此，下。吐數。心飲反，停支而數水屬，乃爲此食脈。愈者，引。自嘔故消氣盡却飲當膈，膿渴支，先有熱微嘔；下爲陽治解心數令可欲以，不爲數汗，此者脈其膿，渴人發癰者不病以有渴反，「家却今嘔嘔，白曰夫先渴問師

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

治傷寒令愈不復，紫石寒食散方見千金翼¹。括蕞根子（防風，桔梗）文蛤（鬼白）
紫石各右，英十各十，分四三，白分味，石，太，乙，餘，散，酒服方寸匕。

