

少，其人不嘔，清便欲自可，一日二三度發。脉微緩者，爲欲愈也；脉微而惡寒者，此陰陽俱虛，不可更發汗更下更吐也；面色反有熱色者，未欲解也。經以其不能得少汗出，身必癢，宜桂枝

麻黃各半湯。桂枝一兩，芍藥二兩，生薑六兩，甘草炙，麻黃去節各一兩，大棗十二枚。杏仁四十枚。水浸，先煮麻黃一兩，兩沸，去上沫，內諸藥，煮取一升，分再服。本云：桂枝湯三合，麻黃湯三合，併為六合，頓服。

〔二四〕
〔二五〕

太桂枝湯初服桂枝湯者，先刺風池、風府，却與桂枝湯。若形如瘧，一日再發者，汗出必解。

太桂枝宜

桂枝一兩十六銖去皮 芍藥一兩六銖 麻黃十六銖去節 生薑一兩十六銖
杏仁十六個去皮尖 甘草一兩二銖炙 大棗五枚擘
右七味，以水五升，先煮麻黃一、二沸，去上沫，內諸藥，煮取二升，
去滓，溫服一升，日再服。①本云：桂枝湯二分，麻黃湯一分，合爲二升，
分再服，今合爲一方，例將息如前法。

〔二六〕服桂枝湯，大汗出後，大煩渴不解，脈洪大者，白

〔二七〕太陽病，發熱惡寒，熱多寒少。脈微弱者，不可大發汗。宜桂枝湯，強桂枝，去芍藥，加茯苓。〔二八〕發汗頭暈者，去桂，加白朮湯，主之。

桂枝湯 桂枝二兩，芍藥二兩，甘草炙一兩，大棗十二枚，生薑半斤。切。煮麻黃一，二沸，去上沫，內諸藥，煮取二升，本云：當裁為越婢湯、桂枝湯，合之飲一升，今合為一方，

桂枝湯二分，越婢一分。芍藥二兩，白朮二兩，生薑切，白朮，茯苓各三兩，大棗十二枚擘。桂枝藥六兩，以水一斗，煮取三升，去滓，溫服一升，小便利則愈。註本云：桂枝湯，今去桂加茯苓。

[illegible]

讖曰病，夜；而答也，伸急，**攣**故湯脛拘之，**脛**陽薑乃脛知兩亡，乾爾兩以則，草，何虛經甘湯服乾，溫飲草再中言熱子更甘溫咽師微附，藥分，如生，亂芍，逆後則出煩與愈，**滓**厥，風汗語重可去，伸，令讖、病，劇當虛桂，急知合增脚爲增結拘故五而兩大。內微，升之，問明尚語一治溫風其陽脛，取法當爲參，；其煮按足浮子躁熱止兩，手，附煩當則二，升旦半大加，足，薑三陽夜而因乾兩湯乾，水象言浮，中，微方，以證曰脉枝咽還湯薑兩，：師口桂，氣氣乾四味曰，寸象逆陽承湯草二問語：形厥半以甘右）

辨太陽病

〔三一〕太陽病，項背強^{几几}，無汗惡風，葛根湯主之。
葛根四兩 麻黃三兩^{去節} 桂枝二兩^{去皮} 芍藥二兩 生薑三兩^切

葛甘七煮忌
根草七取，
四二味三
兩兩升
麻黃大棗
三兩十
兩二枚
桂枝黃
二兩葛
兩根取
芍藥減似
二升，
二兩餘
生薑白桂
三兩沫枝
內將法
諸息
藥及禁

〔三二〕太陽與陽明合病者，必自下利，葛根湯主之。
〔三三〕太陽與陽明合病，不下利，但嘔者，葛根加半夏湯

陽明病，汗出，惡寒，甚，脈沉，身重，加減湯
 主之。葛根八兩，麻黃半斤，芍藥二兩，桂枝二兩去皮，
 甘草二兩，生薑二兩，大棗十二枚，枳實二兩，
 黃芩二兩，知母二兩，石膏二斤，炙甘草二兩，
 麻黃半斤，芍藥二兩，桂枝二兩去皮，甘草二兩，
 生薑二兩，大棗十二枚，枳實二兩，黃芩二兩，
 知母二兩，石膏二斤，炙甘草二兩。

〔三四〕太陽病，桂枝證，醫反下之，利遂不止脈促者，表未解也；喘

〔三五〕太^{分溫再服。}陽病，頭^{溫再服。}痛發熱，身疼腰痛，骨節疼痛，惡風無汗而喘者，麻黃湯主之。

〔三三六〕陽陽與陽明合以病去，喘脉而浮，胸滿者，嗜臥，不可下，外已，宜解麻也。黃湯設。胸滿脅痛者。

[illegible]

〔四十〕傷寒表不解，心下有水氣，乾嘔，發熱而咳，或渴，或

[illegible]

〔四一〕傷寒心下有水氣，咳而微喘，發熱不渴，服湯已，渴者，此寒去欲解也，小青龙湯主之。

〔四三〕^{陽病下之。}太子湯主之。微喘者，表未解故也，桂枝加厚朴杏

桂枝三兩去皮 甘草二兩炙 生薑三兩切 芍藥三兩 大棗十二枚擘
厚朴二兩去皮 杏仁五十枚去皮尖
七味，以水七升，微火煮取三升，去滓，溫服一升，覆取微以

〔四四〕^宜桂枝湯。太^汁陽病，外證未解，不可下，下之爲逆。欲解外者，

浮爲須。愈在外，浮者故不在外，脈浮，脈浮，今下之，復愈。而不令解，故湯汗之桂枝，先反，而愈，陽外病，則太在解。

〔四六〕太陽病，^{解外則愈，且性微陽。}脉浮緊，無汗，發熱，身疼痛，八九日不解，^{此當發其汗。服藥已，微除也。}表證仍在，^{其人發煩，}目瞑，劇者必衄。^{衄乃愈，}所以然者，陽氣重故也，麻黃湯主之。

〔四七〕太陽病，脈浮緊，發熱身無汗，自衄者愈。
〔四八〕二太陽併病，太陽初得病時，發其汗，汗先出不微，
因轉屬陽明，續自微汗出，不惡寒。⊕太陽病證不罷者，
不可下，下之爲逆，⊖如此可以小發汗。設面色緣正赤者，
陽氣怫鬱在表，當解之，⊖若發汗不微，不足言陽氣怫鬱，⊖不得越，

當汗不汗，其人躁煩，不知痛處，乍在腹中，乍在四肢，按之不可得，其人短氣，但坐，以汗出不徹故也，更發汗則愈。○何以知汗

〔四九〕 汗出而解者，以津液自出，故當以和之。若下之，則身重，心微悸，裏虛，不可發汗也。

〔五十五〕脈可病不榮者，數出諸愈藏其緊大不湯已發。解汗，何，者，者而汗氣則，先浮，不枝汗若。〔五十六〕傷寒，脈傷者宜寒病自。〔五十七〕傷凡必。〔五十八〕傷凡必。〔六十二〕後之汗主汗。〔六十三〕後之汗主汗。〔六十四〕後之汗主汗。〔六十五〕後之汗主汗。〔六十六〕後之汗主汗。〔六十七〕傷寒，若吐若下，後汗則動經，身爲振振，反惡寒者，虛故也。〔六十八〕傷寒，若吐若下，後汗則動經，身爲振振，反惡寒者，虛故也。〔六十九〕傷寒，若吐若下，後汗則動經，身爲振振，反惡寒者，虛故也。〔七十〕傷寒，若吐若下，後汗則動經，身爲振振，反惡寒者，虛故也。

〔七一〕太欲小發。〔七二〕太欲小發。〔七三〕傷寒。〔七四〕中風口吐者，五苓散主之。

止倒草。鼓
不顛甘
下復子
吐反樞
必必。
者之
汗者氣主
之發劇少湯
更若若鼓
若。薑
眠之生
口得主子
人不湯樞
得煩鼓，
不虛子者
藥，樞嘔
水後，若
下懷；
後吐懊之
汗汗中主
發發心湯

〔七六〕

[illegible]

之痛者，主結胸。湯中豉心，子厚朴湯主
 湯中豉心，子厚朴湯主
 湯中豉心，子厚朴湯主

厚朴四兩，煮取一升半，去滓，分二服，溫進一服，得吐。
〔八〇〕傷寒，醫以丸藥大下之，身熱不去，微煩者，梔子
乾薑湯主之。大下之後，復發汗亡津，小便不利者，
勿治之，得小便利，必自愈。下之後，復發汗，
必振寒，脈微細，所以然者，以內外俱虛故也。經下之後，
發汗，晝日煩躁，不得眠，夜而安靜，不嘔，不渴，
無表證，脈沈微，身無大熱者，乾薑附子湯主之。

〔八一〕
梔子二枚，用酒洗，去心，擘破。干薑四兩，切。湯個以後子。方藥水服。乾薑二兩，煮取一升半，去滓，分二服，溫進一服，得下，止。病人舊微瀉者，不可與服之。

〔八二〕太頭乾，右陽二病，身暈，汗動，汗振，煮取一升，去滓，頓服。其人仍發熱，心下悸，欲擗地者，玄武湯主之。

〔三〕四五六七八八九〇
〔八〕八八八八八八八八
〔八〕八八八八八八八八

咽淋瘡衄得亡汗病。喉家家眠血家人本乾，雖。家重有發燥不身不，發寒汗者，可疼可不汗。

不可不汗，汗不汗，汗發痛發，發必復汗恍汗下，惚之。

汗汗發出汗則汗亂中此汗心胃。

便，必則寒小逆。

血汗額上。出則陷，脉急緊，直視不能目眴，不瘰癧振，陰疼，與禹餘糧丸。

已口，云武陽王是也。

治不爲逆：本先。

〔九一〕傷寒裏急，救宜逆下；逆下之後，湯瀉之，身續得痛，表裏清利，桂枝下宜。

〔九二〕表發熱，頭痛，脈反沈者，若不差，身體疼痛，當救其裏，宜回逆湯。

〔九三〕太陽病，先下而不愈，因後發汗，其人因致冒，冒家汗出自愈，所以然者，汗出表和故也；裡未和，然後復下之。

〔九四〕太陽病，未解，脉陰陽俱停，下之必先振慄，汗出而解；①但陽脉微者，汗出而解；但陰脉微者，下之而解。②若欲下之，宜調胃承氣湯。

〔九五〕太陽病，發熱汗出者，此爲榮弱衛強，故使汗出，欲救邪風

〔九六〕傷心或微寒煩胸熱柴兩右下去去下加血爭邪得能
傷心或微寒煩胸熱柴兩右下去去下加血爭邪得能
〔九七〕傷心或微寒煩胸熱柴兩右下去去下加血爭邪得能
〔九八〕傷心或微寒煩胸熱柴兩右下去去下加血爭邪得能
〔九九〕傷心或微寒煩胸熱柴兩右下去去下加血爭邪得能
〔一〇〇〕傷心或微寒煩胸熱柴兩右下去去下加血爭邪得能
〔一〇一〕傷心或微寒煩胸熱柴兩右下去去下加血爭邪得能
〔一〇二〕傷心或微寒煩胸熱柴兩右下去去下加血爭邪得能
〔一〇三〕傷心或微寒煩胸熱柴兩右下去去下加血爭邪得能
〔一〇四〕傷心或微寒煩胸熱柴兩右下去去下加血爭邪得能
〔一〇五〕傷心或微寒煩胸熱柴兩右下去去下加血爭邪得能
〔一〇六〕傷心或微寒煩胸熱柴兩右下去去下加血爭邪得能
〔一〇七〕傷心或微寒煩胸熱柴兩右下去去下加血爭邪得能

一 又柴半右兩○ 方胡 十沸八 四半二， 兩夏味去傷 二，滓寒 龍合以， 骨半水溫腹 洗八服滿 黃升一， 升，升，識 芩黃二煮， 生二取四升， 薑切牡蛎， 鉛丹一兩半， 人參大黃， 桂枝六枚， 枝大棗如棋子， 茯苓更煮一， 各一兩， 一， 名

〔一一〇〕 太 陽 病 二 日 水 反 躁 煩 反 熨 必 背 發 大 汗 出 大 熱

〔一一一〕太陽病中風，以火劫發汗，邪風被火熱，血氣流溢，失其常度，兩相熏灼，其身必發黃。☰陽盛則欲衄，陰虛則小便難，陰陽俱虛竭，身體則枯燥，經但頭汗出，劑頸而還，腹滿微喘，口乾咽爛；或不大便，久則讖語；甚者至噦，手

桂枝湯去芍藥，以水一斗，煮取五升，內牡蠣、龍骨，煮取三升，分三次服。此方治心氣不足，怔忡健忘，頭暈目眩，心跳不寧，失眠多夢，盜汗自汗，手足麻木，腰膝痠軟，小便頻數，遺精滑泄，婦女經閉，赤白帶下，產後血虛，諸虛百損，一切虛弱之症，服之立見奇效。

甘草二兩，生薑三兩，大棗十二枚，牡蠣五兩，
龍骨四兩，先煮蜀漆，減二升，內諸藥，煮取三升，
分三次服。此方治心氣不足，怔忡健忘，頭暈目眩，心跳不寧，失眠多夢，盜汗自汗，手足麻木，腰膝痠軟，小便頻數，遺精滑泄，婦女經閉，赤白帶下，產後血虛，諸虛百損，一切虛弱之症，服之立見奇效。

血散脉中，火
 咽逆，逆通因火而盛，病從腰以下
 動爲煩，出，煩乃有汗而解，何何以知
 而則也。
 火，復從煩，煩乃有汗而解，何何以知
 因邪難邪，必當先煩，煩乃有汗而解，何何以知
 爲血，邪無從煩，煩乃有汗而解，何何以知
 之火，灸之，
 灸，灸之，
 反，灸之，
 而灸，灸之，
 甚不可解，
 熱慎攻汗，
 爲，內以，
 浮脉，宜痺，
 脉之微，而脉浮而汗出解。
 邪數雖浮重之，
 火微氣脉必之，
 〔一五六〕

〔一一八〕火逆下之，因燒針煩燥者，桂枝甘草龍骨牡蛎湯主之。

〔一二〇〕太陽病，當惡寒發熱，今自汗出，反不惡寒不發熱，關上脈細數者，以醫吐之過也。此為小逆

〔一二二〕吐之，內煩也。爲熱，當消穀引食，而反吐者，此以發汗，令陽氣微，病人脈虛，脈乃數也。數爲客熱，不能消穀，以胃中虛冷，故

便反澀，腹微滿，鬱微煩，先此時，自極吐下者，與調胃承氣湯；^⑤若不爾者，不可與，但欲嘔，胸胃中痛，微^滿弱者，此非柴胡湯證，以嘔故知極吐也。

〔一二四〕太陽病，六七日，表證仍在，脈微而沈，反不

也，^腦抵當湯主之。^熬水蛭^蠃蟲各三十個^{熬去翅足}桃仁二十個^{去皮尖}大黃三兩^{酒洗}
右四味，以水五升，煮取三升，去滓，溫服一升，不下更服。
〔一二五〕太陽病，身黃，脉沈結，小腹硬。小便不利者，爲無血也；小

〔一二六〕 便傷當可下，水右當二。利有熱，下之，十個，分爲四丸，以水一升，煮一丸，取七合，服之，晬時。其少腹滿，宜抵當丸。如狂者，應小便利，今反不利，當湯主之。血證諦也，抵當丸。爲有血也，桃仁二十五個去皮尖，大黃三兩去翅足熬。〔一二七〕 太苦裏急也。小便利者，以飲水多，必心下悸；小便少者，必

辨太陽病

寸胸曰，結名熱，痛如寒，之：緊來，按曰沈往，答：細不，曰：小，答結脉證，藏關陽，何謂，無病，如浮結也；何何浮結也；其寸可結也，不作結，結胸利治，因結下難者，有日時者滑入，名時滑胎熱，胸，胎上，結沈故白舌之，有脉如上下，病關食舌靜反；胸項浮：飲，反而也結；脉浮，結人，痞成者其問脉狀藏其陽作以胸，於因所結證死。

〔一三二〕病之，發，於因所結證死。〔一三三〕結者，胸亦。

〔一三四〕太陽病，浮而動數，盜汗出，而反惡寒者，表未解也。中胸頸，反懷主還下之，氣若便微盜汗出，而反惡寒者，表未解也。心陷劑，醫懊湯而，短結餘大，氣躁煩，大汗丸，胸處陷，無胸丸。

<p>【一三五】傷按傷胡大太舌從之者，</p> <p>【一三六】</p> <p>【一三七】</p> <p>【一三八】</p> <p>【一三九】</p> <p>【一四〇】</p>	<p>大大右內大大右一服</p> <p>傷按傷胡大太舌從之者，</p> <p>太脉未太</p>	<p>湯兩，未丸斤，別一</p> <p>六石十；胸病燥下</p> <p>陷胸兩，去者，下</p> <p>病弱者病</p>	<p>芒六服</p> <p>蔞二遂下</p> <p>日，胸之發，腹</p> <p>胸主之</p> <p>半升溫三</p> <p>日，復脉</p>	<p>硝升一</p> <p>子味末；</p> <p>大熱無。汗日</p> <p>者之</p> <p>半升溫三</p> <p>日，復脉</p>	<p>升先，</p> <p>升內錢不</p> <p>胸胸在熱</p> <p>復所而</p> <p>正在心</p> <p>下，促</p>	<p>甘大快</p> <p>煮得</p> <p>熬</p> <p>杏仁，</p> <p>熱湯裏</p> <p>下，痛</p> <p>不能臥，若作者，</p>	<p>遂黃利</p> <p>芒</p> <p>硝</p> <p>半蜜服</p> <p>實主，</p> <p>實</p> <p>臥，此胸</p>	<p>錢二止</p> <p>半升</p> <p>合取脉</p> <p>之復</p> <p>不潮可</p> <p>按之則痛</p> <p>但利協</p>	<p>匕升後</p> <p>杏研水為</p> <p>合，下</p> <p>往來寒熱者，惟</p> <p>大熱近者，</p> <p>起，必作結胸；</p>	<p>去滓，內芒硝，煮一兩沸，</p> <p>半升，脂升，禁，</p> <p>五心大陷脉浮滑</p> <p>去滓，內諸藥，煮取</p> <p>起，必作結胸；</p> <p>此為欲解也</p>	<p>芒硝，煮一兩沸，</p> <p>散取藥，心下痛，</p> <p>與大柴</p> <p>六日，煩、主</p> <p>六、胸陷脉浮滑</p> <p>諸藥，煮取</p> <p>心下必結，</p>	<p>煮一兩沸，</p> <p>彈溫頓</p> <p>柴者，</p> <p>日，煩、主</p> <p>六、胸陷脉浮滑</p> <p>煮取</p> <p>必作結胸；</p>
--	---	--	--	--	---	--	---	---	--	---	---	---

〔一四一〕
病其水；可服。文

脈數滑者，在熱，寒
浮者，陽被反實，散五兩
者，頭必痛下血，應不渴胸
結未止。以得者，汗去，無
胸止。解，服熱之彌文證
者緊者，更蛤者，反益散，
必咽痛欲嘔；冷，若三
痛必咽痛欲嘔；冷，若三
脈弦者，沈瀉上差小
者，滑必起胸之粟者陷
兩脅拘急利之欲苓白散亦
急利之欲苓白散亦
拘急利之欲苓白散亦
兩脅拘急利之欲苓白散亦
者，滑必起胸之粟者陷
者，滑必起胸之粟者陷
者，滑必起胸之粟者陷

右

〔一四三〕

{ 一 四 四 }

〔一四〕

〔一四六〕

桂

〔一四七〕

看

寒

寒

六五

二半

陸

(一 五 二)

附

pe

(一五四)

目

(- 五五)

以下

大

右三味，以湯麻沸湯二升漬之，須臾絞去滓分溫再服。

三子黃四味再服。心兩服。以湯麻沸湯二升漬之，須臾絞去滓，內附子汁，

〔一五七〕

傷寒

汗出，解之後，胃中不和，心下痞硬，乾噦食湯

生薑四兩切，甘草三兩炙，人參三兩，乾薑一兩，黃芩三兩，半夏半升，右七味，以水一斗，煮取六升，去滓再煎，水三升，溫服一升，

〔一五八〕

傷寒

中風，腹中雷鳴，下利不止，心下痞硬，人參湯主之。數日，利不止，心下痞硬，人參湯主之。

此非結熱，但以胃中虛，客氣上逆，故使噦也，

甘草四兩炙，黃芩三兩，乾薑三兩，半夏半升洗，大棗十二枚，黃

連一兩，以水一斗，煮取六升，去滓再煎，取三升，溫服一升，

〔一五九〕

傷寒

服湯藥，下利不止，心下痞硬，人參湯主之。數日，利不止，心下痞硬，人參湯主之。

此非結熱，但以胃中虛，客氣上逆，故使噦也，

〔一六〇〕

傷寒

發汗，若吐若下，解後，心下痞硬，噦氣不

〔一六一〕

傷寒

除者，旋復代赭湯主之。旋復花三兩，人參二兩，生薑五兩，代赭一兩，甘草三兩炙，半夏

〔一六二〕

傷寒

下利，不可更行桂枝湯，若汗出而喘，無大熱者，可與麻黃杏

〔一六三〕

傷寒

下利，外證未除，而數下之，遂協熱而利，利

桂枝湯，以水一斗，先煮四味，取五升，內桂，更煮取三升，去滓，

〔一六四〕

傷寒

大下後，復發汗，心下痞，惡寒者，表未解也，不

〔一六五〕

傷寒

發熱，汗出不解，心中痞硬，嘔吐而下利者，

〔一六六〕

傷寒

病如瘧，不寒不熱，頭痛，項強，寸脈微浮，胸中痞硬，氣上衝咽喉，

〔一六七〕

傷寒

若吐若下，七八日不解，熱結在裏，表裏俱

〔一六八〕

傷寒

若吐若下，七八日不解，熱結在裏，表裏俱

知母六兩，石膏一斤碎綿裹，甘草二兩炙，粳米六合，人參三兩，

〔一六九〕

傷寒

無大熱，口燥渴，心煩，背微惡寒者，白

- 〔一七〇〕傷寒，脉浮，無表證者，發熱，無汗，白虎加人參湯主之。
〔一七一〕太陰，陽少，下陽併病，心下鞭，頸項強而眩者，當刺大椎肺俞肝俞，
- 〔一七二〕太陰，陽少，下陽併病，心下鞭，頸項強而眩者，當刺大椎肺俞肝俞，
黃芩湯主之。
- 〔一七三〕傷寒，脉浮，無表證者，發熱，無汗，白虎加人參湯主之。
黃芩湯主之。
- 〔一七四〕傷寒，脉浮，無表證者，發熱，無汗，白虎加人參湯主之。
黃芩湯主之。
- 〔一七五〕傷寒，脉浮，無表證者，發熱，無汗，白虎加人參湯主之。
黃芩湯主之。
- 〔一七六〕傷寒，脉浮，無表證者，發熱，無汗，白虎加人參湯主之。
黃芩湯主之。
- 〔一七七〕傷寒，脉浮，無表證者，發熱，無汗，白虎加人參湯主之。
黃芩湯主之。

辨陽明病

- 〔一七九〕問曰：陽明病，何謂也？
答曰：陽明者，胃家實是也。
- 〔一八〇〕陽明病，何謂也？
答曰：陽明者，胃家實是也。
- 〔一八一〕問曰：陽明病，何謂也？
答曰：陽明者，胃家實是也。
- 〔一八二〕問曰：陽明病，何謂也？
答曰：陽明者，胃家實是也。
- 〔一八三〕問曰：陽明病，何謂也？
答曰：陽明者，胃家實是也。
- 〔一八四〕問曰：陽明病，何謂也？
答曰：陽明者，胃家實是也。
- 〔一八五〕本

〔一八六〕
〔一八七〕

〔一八八〕
〔一八九〕

$$\begin{bmatrix} -190 \\ -191 \end{bmatrix}$$

〔一九二〕陽有

〔一九三〕
〔一九四〕陽

〔一九五〕陽穀

〔一九七〕

〔一九八〕

{ 二〇〇 } 陽
{ 二〇一 }

陽
大

〔一〇四〕 傷

[二〇五]

[二〇六]

(二〇七)

氣者

右
若
大

入在

大小

〔一〇九〕陽明

可与之

頭水替

(二一〇) 夫

〔二一二〕傷寒

若然

〔二一三〕 陽

陽明病，口燥但欲漱水而不欲嘔者，此必衄。
陽明病，本自汗出，反欲得近衣者，此必下。
陽明病，大便硬故也。以亡津液，胃中乾燥，故令大便鞭。當問其小便日幾行，若小便利者，則知不在內而在外也。若小便不利者，則知在內而不在外也。今日再行，故知大便不久出。今為小便數少，以津液當還入胃中，故知不久必大便也。

傷寒陽明病，多汗，雖有陽明證者，不可攻之。不可攻之。攻之利遂不止者死；利止者愈。

陽明病，面合赤色，不可攻之，必發熱；色黃者，小便不利也。

湯下。氣大泄。可至大。不可令。勿氣。下氣。和胃。微。也。解。氣。承。小。目。冬。忍。者。通。酒洗。厚朴。半斤。炙。去。皮。枳。實。五。枚。炙。芒。硝。三。合。內。服。大。黃。更。煮。取。勿。

小承氣湯 厚朴二兩 炙甘草一升 枳實三枚 大者炙
 右三味，以水四升，煮取一升二合，去滓，分溫二服；
 當更衣，不爾者，盡飲之；若更衣者，勿服之。
 明病，潮熱，大便微硬者，可與小承氣湯，不譫者不

腹初與不入但。湯此者之。水。和。湯者飲湯。氣氣欲氣。承失，承。小轉也小。與不食以。少若能，。不也。法之滿少。之攻脹而。知可必鞭。欲乃之復。，攻便。屎也，大。燥屎之必。有燥攻，也。恐有可者攻。此不熱可。日，發不。七者滯後。氣必其。六失後。者。大轉，噦氣。不鞭則生。若中頭水轉。

語也。脈白和者不

至狀之。上鬼安主以見不湯，如而氣，日語惕承六獨怵太、，五寒牀者便惡摸語大不衣，不，循，熱，解潮人不發識後所不下哺則若日發。吐，視。若日者直寒餘劇喘。

若一服利，則止後服。汗多，以津液外出，胃中燥，大便必鞭，々則識語。

攻之。
 〔二四九〕病使人不大便，煩躁，發作有時者，此有燥屎，
 〔二四〇〕病故病枝，下後，六、七日不大便，煩不解，腹滿痛者，
 〔二四一〕大此下，有燥屎也，所以然者，本有宿食故也，宜大承氣湯。
 〔二四二〕病人也，小便不利，大承氣湯。大便難，時有微熱，喘冒不能臥者，有燥
 〔二四三〕食穀欲嘔者，屬陽明也，吳茱萸湯主之。得湯反劇
 〔二四四〕太瘧小者，屬陽明也，此者，以醫下之，後發熱，汗出，復惡寒，不嘔，但心下
 〔二四五〕陽者，數，此者，以醫下之，後發熱，汗出，復惡寒，不嘔，但心下
 〔二四六〕陽者，數，此者，以醫下之，後發熱，汗出，復惡寒，不嘔，但心下
 〔二四七〕陽者，數，此者，以醫下之，後發熱，汗出，復惡寒，不嘔，但心下
 〔二四八〕陽者，數，此者，以醫下之，後發熱，汗出，復惡寒，不嘔，但心下
 〔二四九〕陽者，數，此者，以醫下之，後發熱，汗出，復惡寒，不嘔，但心下
 〔二五〇〕陽者，數，此者，以醫下之，後發熱，汗出，復惡寒，不嘔，但心下
 〔二五一〕陽者，數，此者，以醫下之，後發熱，汗出，復惡寒，不嘔，但心下
 〔二五二〕陽者，數，此者，以醫下之，後發熱，汗出，復惡寒，不嘔，但心下
 〔二五三〕陽者，數，此者，以醫下之，後發熱，汗出，復惡寒，不嘔，但心下
 〔二五四〕陽者，數，此者，以醫下之，後發熱，汗出，復惡寒，不嘔，但心下
 〔二五五〕陽者，數，此者，以醫下之，後發熱，汗出，復惡寒，不嘔，但心下
 〔二五六〕陽者，數，此者，以醫下之，後發熱，汗出，復惡寒，不嘔，但心下
 〔二五七〕陽者，數，此者，以醫下之，後發熱，汗出，復惡寒，不嘔，但心下
 〔二五八〕陽者，數，此者，以醫下之，後發熱，汗出，復惡寒，不嘔，但心下
 〔二五九〕陽者，數，此者，以醫下之，後發熱，汗出，復惡寒，不嘔，但心下
 〔二六〇〕陽者，數，此者，以醫下之，後發熱，汗出，復惡寒，不嘔，但心下
 〔二六一〕陽者，數，此者，以醫下之，後發熱，汗出，復惡寒，不嘔，但心下
 〔二六二〕陽者，數，此者，以醫下之，後發熱，汗出，復惡寒，不嘔，但心下
 〔二六三〕陽者，數，此者，以醫下之，後發熱，汗出，復惡寒，不嘔，但心下
 〔二六四〕陽者，數，此者，以醫下之，後發熱，汗出，復惡寒，不嘔，但心下
 〔二六五〕陽者，數，此者，以醫下之，後發熱，汗出，復惡寒，不嘔，但心下
 〔二六六〕陽者，數，此者，以醫下之，後發熱，汗出，復惡寒，不嘔，但心下
 〔二六七〕陽者，數，此者，以醫下之，後發熱，汗出，復惡寒，不嘔，但心下

辨少陽病

〔二六三〕少陽之病，口苦咽乾目眩也。
 〔二六四〕少陽病，兩耳無所聞，目赤，胸中滿而煩者，不可吐下，吐下則
 〔二六五〕少陽病，兩耳無所聞，目赤，胸中滿而煩者，不可吐下，吐下則
 〔二六六〕少陽病，兩耳無所聞，目赤，胸中滿而煩者，不可吐下，吐下則
 〔二六七〕少陽病，兩耳無所聞，目赤，胸中滿而煩者，不可吐下，吐下則

壞病。陽傷三傷少。合寒陰寒陽。知病六三不三病。犯脉七、日受日欲。何脉浮日三也少時。逆大、陽。脉從。以、無為。治上、大熱。法關、上、三。但人當。欲躁受。眠煩邪。睡者。目此人。合為反。則陽能。汗去入。陰故也。此為。入而陰不嘔。也。此為。

辨太陰病

〔二七三〕太陰病，腹滿而吐，食不下，自利益甚，時
〔二七四〕太陰病，腹滿而吐，食不下，自利益甚，時
〔二七五〕太陰病，腹滿而吐，食不下，自利益甚，時
〔二七六〕太陰病，腹滿而吐，食不下，自利益甚，時
〔二七七〕太陰病，腹滿而吐，食不下，自利益甚，時
〔二七八〕太陰病，腹滿而吐，食不下，自利益甚，時
〔二七九〕太陰病，腹滿而吐，食不下，自利益甚，時
〔二八〇〕太陰病，腹滿而吐，食不下，自利益甚，時

辨少陰病

〔二八一〕少陰病，欲吐，不可下，欲利，不可發汗，此為少陰病，不可治也。
〔二八二〕少陰病，欲吐，不可下，欲利，不可發汗，此為少陰病，不可治也。
〔二八三〕少陰病，欲吐，不可下，欲利，不可發汗，此為少陰病，不可治也。
〔二八四〕少陰病，欲吐，不可下，欲利，不可發汗，此為少陰病，不可治也。
〔二八五〕少陰病，欲吐，不可下，欲利，不可發汗，此為少陰病，不可治也。
〔二八六〕少陰病，欲吐，不可下，欲利，不可發汗，此為少陰病，不可治也。
〔二八七〕少陰病，欲吐，不可下，欲利，不可發汗，此為少陰病，不可治也。
〔二八八〕少陰病，欲吐，不可下，欲利，不可發汗，此為少陰病，不可治也。
〔二八九〕少陰病，欲吐，不可下，欲利，不可發汗，此為少陰病，不可治也。
〔二九〇〕少陰病，欲吐，不可下，欲利，不可發汗，此為少陰病，不可治也。
〔二九一〕少陰病，欲吐，不可下，欲利，不可發汗，此為少陰病，不可治也。
〔二九二〕少陰病，欲吐，不可下，欲利，不可發汗，此為少陰病，不可治也。
〔二九三〕少陰病，欲吐，不可下，欲利，不可發汗，此為少陰病，不可治也。
〔二九四〕少陰病，欲吐，不可下，欲利，不可發汗，此為少陰病，不可治也。
〔二九五〕少陰病，欲吐，不可下，欲利，不可發汗，此為少陰病，不可治也。
〔二九六〕少陰病，欲吐，不可下，欲利，不可發汗，此為少陰病，不可治也。
〔二九七〕少陰病，欲吐，不可下，欲利，不可發汗，此為少陰病，不可治也。
〔二九八〕少陰病，欲吐，不可下，欲利，不可發汗，此為少陰病，不可治也。
〔二九九〕少陰病，欲吐，不可下，欲利，不可發汗，此為少陰病，不可治也。
〔三〇〇〕少陰病，欲吐，不可下，欲利，不可發汗，此為少陰病，不可治也。
〔三〇一〕少陰病，欲吐，不可下，欲利，不可發汗，此為少陰病，不可治也。
〔三〇二〕少陰病，欲吐，不可下，欲利，不可發汗，此為少陰病，不可治也。

- 18 -

與，復。鬱，怫也。愈。氣故則外冷之。人寒利，其中，胃利，者，不。之。出者部主。汗然何湯。極以知莢。復所，茱之。後吳主。席職前痛。柴之。者胡，咽視頭。小。下。汗。滿，久其腹，沫者吐發而涎。熱。大。以。噦吐。發。，，嘔。而。寒。水。寒乾。嘔。傷。之。傷。八九〇。一。七七八。八。三三三。三。

霍亂

〔三八五〕吐利惡寒脉微，而復利。利止，亡血也，回逆加人參湯主之。

[illegible]

〔三九二〕傷寒陰陽易之爲病，其人身體重，少氣，少腹裏急，或引陰中拘攣，熱上衝胸，頭重不欲舉，眼中生花，膝脛拘急者，燒暉散主之。婦人病，取燒作灰。入中禪近隱處，取燒作灰。三服，小便即利，陰頭微腫，此爲愈矣。婦人病，取男子禪燒服。

〔三九三〕大病差後，勞復者，枳實梔子豉湯主之。
枳實三枚，以清漿水七升，煮取四升，內枳實梔子，煮取二升，復令微似汗。若有宿食者，內大黃如博棋子五六枚，服之愈。

〔三九四〕傷寒差後，以少汗發熱，小柴胡湯主之，以下解之。

〔三九五〕大病差後，從腰以下有水氣者，牡蛎澤瀉散主之。

- 19 -

等分

右七味，異搗下篩爲散，更於臼中治之，白飲和服方寸匕；日三服。小便利，止後服。

〔三九六〕大病差後，喜唾，久不了了，胸上有寒，當以丸藥溫之，宜理中丸。

〔三九七〕傷寒解後，虛羸少氣，逆欲吐，竹葉石膏湯主之。

竹葉二把 石膏 半夏半升洗 麥門冬一升去心 人參二兩 甘草二兩炙 粳米半升

右七味，以水一斗，煮取六升，去滓，內粳米，煮米熟，湯成，

〔三九八〕右去病人不能消穀，故令微煩，損穀則愈。以病新差，人強與穀，脾胃氣尚弱，