

法医学中間テスト② 2008.12.05

日本語として読みやすいかどうかにも採点します。

1、年齢推定に使われる所見名(単語、短いフレーズ)を列挙しなさい。

2、皮膚に離断がなくて、皮膚及び皮下組織が下層から剥離した状態を何というか。

ドイツ語：Ablederung、フランス語：decollement

カタカナ：

漢字：

3、気胸の存在はどのような所見があれば推定できるか。

4、創端が線分状になるのはどのような場合か。

5、他為の銃創(射入口)ができない部位は？(レジメの図に基づいて)

6、授業中に「かたゆでの卵で実験するのがいい」と言ったのは、何に関しての話題であったか？

7、シートベルトによる損傷はどのような種類(例：切創…)の損傷からできているか。

8、刺創(刃器による)と刺切創の違いを図に描きなさい。説明の文字は必要最小限にしなさい。

2008 年度法医学中間テスト② 解答案

- 1 陰毛の白髪、歯の咬耗、頭蓋冠縫合の融合、椎骨の極形成、爪の硬さ・厚さ・縦線、上腕骨骨髓腔の高さ、種痘痕の数、外観(顔、肌のつや・はり、歯の勢い、髪の様子など)
- 2 カタカナ：デコルマン 漢字：剥(剥)皮創
- 3 皮下気腫、打診をした時の音響の違い、胸部の損傷
- 4 峰の厚さが 3~5mm 以上の刺器による刺創・刺切創、肉厚な刃器による割創、同様な性質の鈍体による挫裂創
- 5 口の中、頭頂部
- 6 頭蓋冠に平面が作用しても陥没骨折ができる
- 7 表皮剥脱、皮下出血、皮内出血

